

**1**

解答解説のページへ

$\omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$  とおく。ただし、 $i$  は虚数単位である。

- (1) 実数  $a, b, c, d$  に対して  $a + b\omega = c + d\omega$  が成り立つとき、 $a = c$  かつ  $b = d$  であることを示せ。
- (2) 実数  $x, y$  に対して、実数  $s, t$  を  $s + t\omega = \omega(x + y\omega)$  によって定めるとき、
$$\begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$
 となる 2 次の正方行列  $A$  を求めよ。
- (3)  $n = 1, 2, 3, \dots$  のとき、上の  $A$  に対して  $(A^2 + E)^{3n}$  を求めよ。ただし、 $E$  は単位行列である。

2

解答解説のページへ

不等式  $\cos 2x + cx^2 \geq 1$  がすべての  $x$  について成り立つような定数  $c$  の値の範囲を求めよ。

**3**

解答解説のページへ

$xy$  平面上の円  $x^2 + y^2 = 1$  へ、この円の外部の点  $P(a, b)$  から 2 本の接線を引き、その接点を  $A, B$  とし、線分  $AB$  の中点を  $Q$  とする。

- (1) 点  $Q$  の座標を  $a, b$  を用いて表せ。
- (2) 点  $P$  が円  $(x-3)^2 + y^2 = 1$  の上を動くとき、点  $Q$  の軌跡を求めよ。

解答解説のページへ

**4** $-1 < a < 1$  とする。(1) 積分  $\int_0^a \frac{1}{1-x^2} dx$  を求めよ。(2)  $n = 1, 2, 3, \dots$  のとき, 次の等式を示せ。

$$\int_0^a \frac{x^{2n+2}}{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \log \frac{1+a}{1-a} - \sum_{k=0}^n \frac{a^{2k+1}}{2k+1}$$

(3) 次の等式を示せ。

$$\log \frac{1+a}{1-a} = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^{2k+1}}{2k+1}$$

**5**

解答解説のページへ

A, B, C の 3 人が次のように勝負をくり返す。1 回目には A と B の間で硬貨投げにより勝敗を決める。2 回目以降には、直前の回の勝者と参加しなかった残りの 1 人との間で、やはり硬貨投げにより勝敗を決める。この勝負をくり返し、誰かが 2 連勝するか、または 100 回目の勝負を終えたとき、終了する。ただし、硬貨投げで勝つ確率は各々  $\frac{1}{2}$  である。

- (1) 4 回以内の勝負で A が 2 連勝する確率を求めよ。
- (2)  $n = 2, 3, \dots, 100$  とする。 $n$  回以内の勝負で、A, B, C のうち誰かが 2 連勝する確率を求めよ。

1

問題のページへ

$$(1) \quad a + b\omega = c + d\omega \text{ より, } (a - c) + (b - d)\omega = 0 \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$b - d \neq 0 \text{ とすると, } \omega = -\frac{a - c}{b - d} \cdots \cdots \textcircled{2}$$

②の左辺は虚数, また  $a, b, c, d$  が実数より右辺は実数となるので, ②は不成立。

よって,  $b - d = 0$  となる。すると, ①より  $a - c = 0$ , すなわち  $a = c$  かつ  $b = d$  が成り立つ。

$$(2) \quad \omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2} \text{ より } \omega^3 = 1 \text{ となり, } (\omega - 1)(\omega^2 + \omega + 1) = 0 \text{ かつ } \omega \neq 1 \text{ から,}$$

$$\omega^2 + \omega + 1 = 0 \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$\text{条件より, } s + t\omega = \omega(x + y\omega) = x\omega + y\omega^2$$

$$\textcircled{3} \text{ を用いると, } s + t\omega = x\omega + y(-\omega - 1) = -y + (x - y)\omega$$

$$(1) \text{ より, } s = -y, \quad t = x - y \text{ となり, } \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\text{よって, } A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(3) \quad \text{ハミルトン・ケーリーの定理より, } A^2 + A + E = O \cdots \cdots \textcircled{4}$$

$$\text{ここで}\textcircled{4}\text{の両辺に左から } A - E \text{ をかけると, } (A - E)(A^2 + A + E) = O$$

$$A^3 - E = O, \quad A^3 = E \cdots \cdots \textcircled{5}$$

$$\text{すると, } \textcircled{4}\textcircled{5}\text{から } (A^2 + E)^{3n} = (-A)^{3n} = \{(-A)^3\}^n = (-E)^n = (-1)^n E$$

### [解説]

(1)は背理法を用いて証明するのが題意なのでしょうか。それとも,  $x$  と  $y$  が実数のとき  $x + yi = 0$  と  $x = y = 0$  が同値ということを利用するのでしょうか。とまどってしまいます。なお, (2)と(3)はともに有名問題です。

2

問題のページへ

不等式  $\cos 2x + cx^2 \geq 1 \dots\dots ①$  がすべての  $x$  について成り立つ条件は,

(i)  $x = 0$  のとき ①は  $1 + c \times 0 \geq 1$  となるので, 任意の  $c$  で成立する。

(ii)  $x \neq 0$  のとき ①より,  $c \geq \frac{1 - \cos 2x}{x^2} \dots\dots ②$


ここで,  $f(x) = \frac{1 - \cos 2x}{x^2} = \frac{2 \sin^2 x}{x^2} = 2 \left( \frac{\sin x}{x} \right)^2 = 2 \left| \frac{\sin x}{x} \right|^2$  は,  $f(-x) = f(x)$  な

ので,  $x > 0$  としても一般性を失わない。

さて, 曲線  $y = |\sin x|$  ( $x > 0$ ) 上の任意

の点を  $P(x, |\sin x|)$  とおくと,  $\left| \frac{\sin x}{x} \right|$

は直線  $OP$  の傾きとなる。



ここで,  $\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{\sin x}{x} \right| = 1$  となるので,  $0 \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right| < 1$

これより,  $0 \leq f(x) < 2$  となる。

よって, どんな  $x$  に対しても②が成立するのは,  $c \geq 2$  のときである。

(i)(ii)より, 求める  $c$  の範囲は  $c \geq 2$  である。

### 【解説】

定数を分離したあと, 分数関数のとる値の範囲を直線の傾きで考えるという有名なテクニックを用いました。

3

問題のページへ

- (1)  $OA = OB$ ,  $PA = PB$  より,  $AB$  の中点  $Q$  は直線  $AB$  と  $OP$  の交点となり, しかも  $OP \perp AB$  である。

すると,  $\triangle OAQ \sim \triangle OPA$  より,  $OQ : OA = OA : OP$  となるので,

$$OP \cdot OQ = OA^2 = 1 \cdots \cdots \textcircled{1}$$

ここで,  $Q(x, y)$  とおくと,  $\overrightarrow{OQ} = k\overrightarrow{OP}$  ( $k > 0$ ) より,

$$x = ka, \quad y = kb \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{ から, } \sqrt{a^2 + b^2} \sqrt{x^2 + y^2} = 1, \quad (a^2 + b^2)(x^2 + y^2) = 1 \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{2} \text{ を } \textcircled{3} \text{ に代入して, } k^2(a^2 + b^2) = 1, \quad k > 0 \text{ より } k = \frac{1}{a^2 + b^2}$$

$$\textcircled{2} \text{ より, } x = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad y = \frac{b}{a^2 + b^2} \cdots \cdots \textcircled{4} \text{ なので, } Q\left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{b}{a^2 + b^2}\right)$$

$$(2) \quad \textcircled{3} \textcircled{4} \text{ より, } a = (a^2 + b^2)x = \frac{x}{x^2 + y^2} \cdots \cdots \textcircled{5}$$

$$b = (a^2 + b^2)y = \frac{y}{x^2 + y^2} \cdots \cdots \textcircled{6}$$

条件より  $P(a, b)$  が  $(x-3)^2 + y^2 = 1$  上を動くので,

$$(a-3)^2 + b^2 = 1 \cdots \cdots \textcircled{7}$$

$$\textcircled{5} \textcircled{6} \text{ を } \textcircled{7} \text{ に代入して, } \left(\frac{x}{x^2 + y^2} - 3\right)^2 + \left(\frac{y}{x^2 + y^2}\right)^2 = 1$$


$$\{x - 3(x^2 + y^2)\}^2 + y^2 = (x^2 + y^2)^2$$

$$x^2 - 6x(x^2 + y^2) + 8(x^2 + y^2)^2 + y^2 = 0$$

$$x^2 + y^2 \neq 0 \text{ より, } 1 - 6x + 8(x^2 + y^2) = 0$$

$$\text{よって, } x^2 + y^2 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{8} = 0 \quad (\text{この式は } x^2 + y^2 \neq 0 \text{ を満たす})$$

以上より, 点  $Q$  は円  $x^2 + y^2 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{8} = 0$  を描く。



### [解説]

本問もまた有名問題です。そして,  $\textcircled{1}$  の式を導くには, 経験が必要となります。



4

問題のページへ

$$(1) \int_0^a \frac{1}{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^a \left( \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right) dx = \frac{1}{2} \left[ -\log|1-x| + \log|1+x| \right]_0^a$$

$$= \frac{1}{2} \left[ \log \left| \frac{1+x}{1-x} \right| \right]_0^a = \frac{1}{2} \log \frac{1+a}{1-a} \quad (-1 < a < 1 \text{ より})$$

$$(2) \int_0^a \frac{x^{2n+2}}{1-x^2} dx = \int_0^a \frac{1-1+x^{2n+2}}{1-x^2} dx = \int_0^a \frac{1}{1-x^2} dx - \int_0^a \frac{1-(x^2)^{n+1}}{1-x^2} dx$$

ここで, (1)より,  $\int_0^a \frac{1}{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \log \frac{1+a}{1-a}$

$$\text{また, } \int_0^a \frac{1-(x^2)^{n+1}}{1-x^2} dx = \int_0^a (1+x^2+x^4+\cdots+x^{2n}) dx$$

$$= \left[ x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right]_0^a$$

$$= a + \frac{a^3}{3} + \frac{a^5}{5} + \cdots + \frac{a^{2n+1}}{2n+1}$$

$$\text{よって, } \int_0^a \frac{x^{2n+2}}{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \log \frac{1+a}{1-a} - \sum_{k=0}^n \frac{a^{2k+1}}{2k+1}$$

$$(3) \text{ (i) } 0 \leq a < 1 \text{ のとき } 0 \leq x \leq a \text{ において, } 0 \leq \frac{x^{2n+2}}{1-x^2} \leq \frac{x^{2n+2}}{1-a^2}$$

$$0 \leq \int_0^a \frac{x^{2n+2}}{1-x^2} dx \leq \int_0^a \frac{x^{2n+2}}{1-a^2} dx = \frac{1}{1-a^2} \left[ \frac{x^{2n+3}}{2n+3} \right]_0^a = \frac{a^{2n+3}}{(1-a^2)(2n+3)}$$

$$\text{よって, } n \rightarrow \infty \text{ のとき, } \int_0^a \frac{x^{2n+2}}{1-x^2} dx \rightarrow 0$$

$$\text{(ii) } -1 < a < 0 \text{ のとき } a \leq x \leq 0 \text{ において, } 0 \leq \frac{x^{2n+2}}{1-x^2} \leq \frac{x^{2n+2}}{1-a^2}$$

$$0 \leq \int_a^0 \frac{x^{2n+2}}{1-x^2} dx \leq \int_a^0 \frac{x^{2n+2}}{1-a^2} dx = \frac{1}{1-a^2} \left[ \frac{x^{2n+3}}{2n+3} \right]_a^0 = -\frac{a^{2n+3}}{(1-a^2)(2n+3)}$$

$$\text{よって, } n \rightarrow \infty \text{ のとき, } \int_a^0 \frac{x^{2n+2}}{1-x^2} dx = -\int_a^0 \frac{x^{2n+2}}{1-x^2} dx \rightarrow 0$$

$$\text{(i)(ii)より, } -1 < a < 1 \text{ のとき, } n \rightarrow \infty \text{ とすると, } \int_0^a \frac{x^{2n+2}}{1-x^2} dx \rightarrow 0$$

$$\text{すると, (2)より, } \log \frac{1+a}{1-a} - 2 \int_0^a \frac{x^{2n+2}}{1-x^2} dx = 2 \sum_{k=0}^n \frac{a^{2k+1}}{2k+1} \text{ なので,}$$

$$\log \frac{1+a}{1-a} = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^{2k+1}}{2k+1}$$

## 【解説】

無限級数の値を積分を用いて求めるという頻出題です。パズルのような誘導がついているおもしろい問題です。

5

問題のページへ

- (1) 4 回以内の勝負で A が 2 連勝するのは、勝者が順に、AA または BCAA の場合なので、その確率は、

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{16}$$

- (2) A, B, C の誰も 2 連勝せずに  $n$  回目が終了するのは、ACBACBACB……または BCABCABCA……の場合なので、その確率は、

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

よって、 $n$  回以内の勝負で、A, B, C のうち誰かが 2 連勝する確率は、

$$1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

### [解説]

有名な巴戦の問題です。なお、文系に 100 回目を 4 回目に変更した問題が出ています。