

1

解答解説のページへ

$a$  を正の実数とし、2つの放物線

$$C_1 : y = x^2, \quad C_2 : y = x^2 - 4ax + 4a$$

を考える。

- (1)  $C_1$  と  $C_2$  の両方に接する直線  $l$  の方程式を求めよ。
- (2) 2つの放物線  $C_1, C_2$  と直線  $l$  で囲まれた図形の面積を求めよ。

2

解答解説のページへ

実数を成分とする行列  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  が  $A^2 - A + E = O$  を満たすとき、以下の問いに

答えよ。ただし、 $E$  は単位行列、 $O$  は零行列である。

- (1)  $A$  は逆行列をもつことを示せ。
- (2)  $a+d$  と  $ad-bc$  を求めよ。
- (3)  $b > 0$ ,  $A^{-1} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$  のとき、 $A$  を求めよ。

3

解答解説のページへ

正の実数  $r$  と  $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$  の範囲の実数  $\theta$  に対して、 $a_0 = r \cos \theta$ 、 $b_0 = r$  とおく。

$a_n, b_n$  ( $n=1, 2, 3, \dots$ ) を漸化式

$$a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, \quad b_n = \sqrt{a_n b_{n-1}}$$

により定める。以下の問いに答えよ。

- (1)  $\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}$  を  $\theta$  で表せ。
- (2)  $\frac{a_n}{b_n}$  を  $n$  と  $\theta$  で表せ。
- (3)  $\theta \neq 0$  のとき、 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{r \sin \theta}{\theta}$  を示せ。

4

解答解説のページへ

 $0 \leq x \leq 1$  に対して

$$f(x) = \int_0^1 e^{-|t-x|} t(1-t) dt$$

と定める。ただし、 $e = 2.718\dots$  は自然対数の底である。

- (1) 不定積分  $I_1 = \int te^t dt$ ,  $I_2 = \int t^2 e^t dt$  を求めよ。
- (2)  $f(x)$  を  $x$  の指数関数と多項式を用いて表せ。
- (3)  $f(x)$  は  $x = \frac{1}{2}$  で極大となることを示せ。

5

解答解説のページへ

2本の当たりくじを含む102本のくじを、1回に1本ずつ、くじがなくなるまで引き続けることにする。

- (1)  $n$ 回目に1本目の当たりくじが出る確率を求めよ。
- (2) A, B, Cの3人が, A, B, C, A, B, C, A, …の順に, このくじ引きを行うとする。1本目の当たりくじをAが引く確率を求めよ。BとCについても, 1本目の当たりくじを引く確率を求めよ。

1

問題のページへ

(1) 放物線  $C_1 : y = x^2 \cdots \cdots \textcircled{1}$ ,  $C_2 : y = x^2 - 4ax + 4a \cdots \cdots \textcircled{2}$  に対して,

①より,  $y' = 2x$  となり, 接点  $(t, t^2)$  とおくと, 接線の方程式は,

$$y - t^2 = 2t(x - t), \quad y = 2tx - t^2 \cdots \cdots \textcircled{3}$$

②③を連立して,  $x^2 - 4ax + 4a = 2tx - t^2$

$$x^2 - 2(2a+t)x + 4a+t^2 = 0 \cdots \cdots \textcircled{4}$$

放物線②と接線③が接することより, ④は重解をもち,

$$D/4 = (2a+t)^2 - (4a+t^2) = 0, \quad a^2 + at - a = 0$$

$a > 0$  から,  $a+t-1=0, t=1-a \cdots \cdots \textcircled{5}$

③に代入すると, 接線  $l$  の方程式は,


$$y = 2(1-a)x - (1-a)^2$$

(2) ④の重解は, ⑤より,  $x = 2a+t = 2a+1-a = 1+a$

また, ①と②の交点は,  $x^2 = x^2 - 4ax + 4a$  より,  $x = 1$

よって,  $C_1, C_2$  と  $l$  で囲まれた図形の面積  $S$  は,

$$\begin{aligned} S &= \int_{1-a}^1 \{x - (1-a)\}^2 dx + \int_1^{1+a} \{x - (1+a)\}^2 dx \\ &= \frac{1}{3} \left[ \{x - (1-a)\}^3 \right]_{1-a}^1 + \frac{1}{3} \left[ \{x - (1+a)\}^3 \right]_1^{1+a} \\ &= \frac{1}{3} a^3 + \frac{1}{3} a^3 = \frac{2}{3} a^3 \end{aligned}$$



### [解説]

よく見かける構図で, 過去に多数の大学で出題されてきた頻出問題です。

2

問題のページへ

- (1) 条件より,  $A^2 - A + E = O$  ……①に対して,  $A - A^2 = E$  となり,  

$$A(E - A) = (E - A)A = E$$
よって,  $A$  は逆行列をもち,  $A^{-1} = E - A$  ……②である。
- (2) ハミルトン・ケーリーの定理より,  $A^2 - (a+d)A + (ad - bc)E = O$  ……③  
①③より,  $(-a-d+1)A + (ad - bc - 1)E = O$  ……④
- (i)  $-a-d+1=0$  のとき  
④より,  $ad - bc - 1 = 0$  となり,  $a+d=1$ ,  $ad - bc = 1$
- (ii)  $-a-d+1 \neq 0$  のとき  
④より,  $A = \frac{ad - bc - 1}{a+d-1}E$  となり,  $k = \frac{ad - bc - 1}{a+d-1}$  とおくと,  $A = kE$  である。  
①に代入すると,  $(k^2 - k + 1)E = O$  となり,  $k^2 - k + 1 = 0$   
ところが,  $k = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$  となり, 行列  $A$  の成分が実数であることに反する。
- (i)(ii)より,  $a+d=1$ ,  $ad - bc = 1$
- (3) ②より,  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1-a & -b \\ -c & 1-d \end{pmatrix}$  であり, 一方, 条件から  $A^{-1} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$  なので,  
 $1-a = a$  ……⑤,  $-b = c$  ……⑥,  $1-d = d$  ……⑦  
⑤⑦より,  $a = d = \frac{1}{2}$  ……⑧  
(2)から  $ad - bc = 1$  なので, ⑥⑧を代入すると,  $\frac{1}{4} + b^2 = 1$  から,  $b^2 = \frac{3}{4}$   
すると,  $b > 0$  より  $b = \frac{\sqrt{3}}{2}$  となり, ⑥から  $c = -\frac{\sqrt{3}}{2}$  であるので,  

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$$

## [解説]

行列の方程式について, 参考書の例題に載っているような問題です。

3

問題のページへ

(1) 条件より,  $r > 0$ ,  $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$  に対して,  $a_0 = r \cos \theta$ ,  $b_0 = r$  であり,

$$a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, \quad b_n = \sqrt{a_n b_{n-1}}$$

すると, 帰納的に,  $a_n > 0$ ,  $b_n > 0$  である。

$$\text{さて, } a_1 = \frac{a_0 + b_0}{2} = \frac{r \cos \theta + r}{2} = r \cdot \frac{\cos \theta + 1}{2} = r \cos^2 \frac{\theta}{2}$$

$$b_1 = \sqrt{a_1 b_0} = \sqrt{r \cos^2 \frac{\theta}{2} \cdot r} = r \cos \frac{\theta}{2}$$

$$a_2 = \frac{a_1 + b_1}{2} = \frac{r \cos^2 \frac{\theta}{2} + r \cos \frac{\theta}{2}}{2} = r \cos \frac{\theta}{2} \cdot \frac{\cos \frac{\theta}{2} + 1}{2} = r \cos \frac{\theta}{2} \cos^2 \frac{\theta}{4}$$

$$b_2 = \sqrt{a_2 b_1} = \sqrt{r \cos \frac{\theta}{2} \cos^2 \frac{\theta}{4} \cdot r \cos \frac{\theta}{2}} = r \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{4}$$

$$\text{よって, } \frac{a_1}{b_1} = \cos \frac{\theta}{2}, \quad \frac{a_2}{b_2} = \cos \frac{\theta}{4}$$

(2) 0 以上の整数  $n$  に対して,  $\frac{a_n}{b_n} = \cos \frac{\theta}{2^n}$  であることを, 数学的帰納法で証明する。

(i)  $n = 0$  のとき  $a_0 = r \cos \theta$ ,  $b_0 = r$  より,  $\frac{a_0}{b_0} = \cos \frac{\theta}{2^0}$  となり成り立つ。

(ii)  $n = k$  のとき  $\frac{a_k}{b_k} = \cos \frac{\theta}{2^k}$  すなわち  $a_k = b_k \cos \frac{\theta}{2^k}$  が成り立つと仮定すると,

$$a_{k+1} = \frac{a_k + b_k}{2} = \frac{b_k \cos \frac{\theta}{2^k} + b_k}{2} = b_k \cdot \frac{\cos \frac{\theta}{2^k} + 1}{2} = b_k \cos^2 \frac{\theta}{2^{k+1}}$$

$$b_{k+1} = \sqrt{a_{k+1} b_k} = \sqrt{b_k \cos^2 \frac{\theta}{2^{k+1}} \cdot b_k} = b_k \cos \frac{\theta}{2^{k+1}}$$

よって,  $\frac{a_{k+1}}{b_{k+1}} = \cos \frac{\theta}{2^{k+1}}$  となり,  $n = k + 1$  のときも成立する。

(i)(ii)より,  $n \geq 0$  において,  $\frac{a_n}{b_n} = \cos \frac{\theta}{2^n}$  である。

(3) (2)より,  $b_{n+1} = b_n \cos \frac{\theta}{2^{n+1}}$  なので,  $n \geq 1$  で,

$$\begin{aligned} b_n &= b_0 \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2^2} \cdots \cos \frac{\theta}{2^{n-2}} \cos \frac{\theta}{2^{n-1}} \cos \frac{\theta}{2^n} \\ &= r \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2^2} \cdots \cos \frac{\theta}{2^{n-2}} \cos \frac{\theta}{2^{n-1}} \cos \frac{\theta}{2^n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{すると, } b_n \sin \frac{\theta}{2^n} &= r \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2^2} \cdots \cos \frac{\theta}{2^{n-2}} \cos \frac{\theta}{2^{n-1}} \cos \frac{\theta}{2^n} \sin \frac{\theta}{2^n} \\ &= r \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2^2} \cdots \cos \frac{\theta}{2^{n-2}} \cos \frac{\theta}{2^{n-1}} \cdot \frac{1}{2} \sin \frac{\theta}{2^{n-1}} \\ &= r \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2^2} \cdots \cos \frac{\theta}{2^{n-2}} \cdot \frac{1}{2^2} \sin \frac{\theta}{2^{n-2}} \\ &= r \cos \frac{\theta}{2} \cdot \frac{1}{2^{n-1}} \sin \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2^n} r \sin \theta \end{aligned}$$



$$\text{よって, } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{\frac{1}{2^n} r \sin \theta}{\sin \frac{\theta}{2^n}} = \frac{r \sin \theta}{\theta} \cdot \frac{\frac{\theta}{2^n}}{\sin \frac{\theta}{2^n}} = \frac{r \sin \theta}{\theta}$$

$$(2) \text{より, } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \cos \frac{\theta}{2^n} = \frac{r \sin \theta}{\theta}$$

### 【解説】

漸化式と極限についての問題です。解法の流れを読み取ることは難しくありません。ただ、(3)で、数列 $\{b_n\}$ の一般項を、2倍角の公式を用いてまとめる部分は、経験がものをいいます。

4

問題のページへ

$$(1) \quad C_1, C_2 \text{ を定数として, } I_1 = \int te^t dt = te^t - \int e^t dt = (t-1)e^t + C_1$$

$$I_2 = \int t^2 e^t dt = t^2 e^t - 2I_1 = t^2 e^t - 2(t-1)e^t + C_2 = (t^2 - 2t + 2)e^t + C_2$$

(2)  $0 \leq x \leq 1$  に対して,

$$f(x) = \int_0^1 e^{-|t-x|} t(1-t) dt = \int_0^x e^{t-x} t(1-t) dt + \int_x^1 e^{-t+x} t(1-t) dt$$

$$\begin{aligned} \text{さて, } \int_0^x e^{t-x} t(1-t) dt &= e^{-x} \int_0^x (te^t - t^2 e^t) dt = e^{-x} [I_1 - I_2]_0^x \\ &= e^{-x} [(-t^2 + 3t - 3)e^t]_0^x = e^{-x} \{(-x^2 + 3x - 3)e^x + 3\} \\ &= -x^2 + 3x - 3 + 3e^{-x} \end{aligned}$$

また,  $-t = u$  とおくと,

$$\begin{aligned} \int_x^1 e^{-t+x} t(1-t) dt &= e^x \int_x^{-1} (te^{-t} - t^2 e^{-t}) dt = e^x \int_{-x}^{-1} (-ue^u - u^2 e^u)(-du) \\ &= e^x [I_1 + I_2]_{-x}^{-1} = e^x [(u^2 - u + 1)e^u]_{-x}^{-1} \\ &= e^x \{3e^{-1} - (x^2 + x + 1)e^{-x}\} = 3e^{x-1} - (x^2 + x + 1) \end{aligned}$$

したがって,  $f(x) = 3e^{-x} + 3e^{x-1} - 2x^2 + 2x - 4$

(3) (2)より,  $f'(x) = -3e^{-x} + 3e^{x-1} - 4x + 2$ ,  $f''(x) = 3e^{-x} + 3e^{x-1} - 4$  となり,

$$f'\left(\frac{1}{2}\right) = -3e^{-\frac{1}{2}} + 3e^{\frac{1}{2}} - 2 + 2 = 0$$

$$f''\left(\frac{1}{2}\right) = 3e^{-\frac{1}{2}} + 3e^{\frac{1}{2}} - 4 = \frac{6}{\sqrt{e}} - 4 = \frac{2}{\sqrt{e}}(3 - 2\sqrt{e}) = \frac{2}{\sqrt{e}} \cdot \frac{9 - 4e}{3 + 2\sqrt{e}}$$

ここで,  $4e > 4 \times 2.7 = 10.8$  から,  $f''\left(\frac{1}{2}\right) < 0$  である。

よって,  $f(x)$  は  $x = \frac{1}{2}$  で極大となる。

### [解説]

(2)の積分を計算するうえで, (1)の誘導がかなり役に立ちます。また, (3)では, 増減表は作成しにくいので, 第2次導関数の値を利用しています。

5

問題のページへ

- (1)  $n$  回目に 1 本目の当たりくじが出るのは、1 回目から  $n-1$  回目までは、はずれくじ、 $n$  回目に当たりくじを引く場合より、その確率は、

$$\frac{{}_{100}P_{n-1} \times 2}{{}_{102}P_n} = \frac{100!}{(101-n)!} \times 2 = \frac{2(102-n)}{101 \cdot 102} = \frac{102-n}{5151}$$

なお、この式は  $n=1$ 、 $n=102$  のときも成立する。

- (2) A が  $n$  回目に 1 本目の当たりくじを引くのは、 $n=3k+1$  ( $0 \leq k \leq 33$ ) のときより、その確率は、

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{33} \frac{102-(3k+1)}{5151} &= \frac{1}{5151} \sum_{k=0}^{33} (101-3k) = \frac{1}{5151} (101 \times 34 - 3 \cdot \frac{1}{2} \times 33 \times 34) \\ &= \frac{17}{5151} (101 \times 2 - 3 \times 33) = \frac{103}{303} \end{aligned}$$

同様に、B が  $n$  回目に 1 本目の当たりくじを引くのは、 $n=3k+2$  ( $0 \leq k \leq 33$ ) のときより、その確率は、

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{33} \frac{102-(3k+2)}{5151} &= \frac{1}{5151} \sum_{k=0}^{33} (100-3k) = \frac{1}{5151} (100 \times 34 - 3 \cdot \frac{1}{2} \times 33 \times 34) \\ &= \frac{17}{5151} (100 \times 2 - 3 \times 33) = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

また、C が  $n$  回目に 1 本目の当たりくじを引く確率は、

$$1 - \frac{103}{303} - \frac{1}{3} = \frac{33}{101}$$

### [解説]

確率の基本問題です。計算も予想よりは簡単でした。