

1

解答解説のページへ

$f(x) = 2x^3 + x^2 - 3$ とおく。直線 $y = mx$ が曲線 $y = f(x)$ と相異なる 3 点で交わるような実数 m の範囲を求めよ。

2

解答解説のページへ

正の整数 n に対して,

$$S(n) = \sum_{p=1}^{2n} \frac{(-1)^{p-1}}{p}, \quad T(n) = \sum_{q=1}^n \frac{1}{n+q}$$

とおく。等式 $S(n) = T(n)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) が成り立つことを、数学的帰納法を用いて示せ。

3

解答解説のページへ

空間内の 4 点 A, B, C, D が

$$AB = 1, \quad AC = 2, \quad AD = 3, \quad \angle BAC = \angle CAD = 60^\circ, \quad \angle DAB = 90^\circ$$

を満たしている。この 4 点から等距離にある点を E とする。線分 AE の長さを求めよ。

4

解答解説のページへ

θ を $0 \leq \theta < 2\pi$ を満たす実数とする。時刻 t における座標が

$$x = t \cos \theta, \quad y = 1 - t^2 + t \sin \theta$$

で与えられるような動点 $P(x, y)$ を考える。 t が実数全体を動くとき、点 P が描く曲線を C とする。 C が x 軸の $x \geq 0$ の部分と交わる点を Q とする。以下の問いに答えよ。

- (1) $\theta = \frac{\pi}{4}$ のとき、 Q の x 座標を求めよ。
- (2) θ が変化すると曲線 C も変化する。 θ が $0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲を変化するとき、 C が通過する範囲を xy 平面上に図示せよ。
- (3) θ が変化すると点 Q も変化する。 Q の x 座標が最大となるような θ ($0 \leq \theta < 2\pi$) について $\tan \theta$ の値を求めよ。

5

解答解説のページへ

n を正の整数, a を正の実数とする。曲線 $y = x^n$ と曲線 $y = a \log x$ が, 点 P で共通の接線をもつとする。ただし, 対数は自然対数である。点 P の x 座標を t とするとき, 以下の問いに答えよ。

- (1) a, t をそれぞれ n を用いて表せ。
- (2) 曲線 $y = x^n$ と x 軸および直線 $x = t$ で囲まれる部分の面積を S_1 とする。また, 曲線 $y = a \log x$ と x 軸および直線 $x = t$ で囲まれる部分の面積を S_2 とする。このとき, $\frac{S_2}{S_1}$ を n を用いて表せ。
- (3) $x \geq 0$ のとき, 不等式 $\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} \leq e^{-x} + x - 1 \leq \frac{x^2}{2}$ が成り立つことを, 次の(a), (b) に分けて示せ。ただし, e は自然対数の底とする。
 - (a) $x \geq 0$ のとき, 不等式 $e^{-x} + x - 1 \leq \frac{x^2}{2}$ が成り立つことを示せ。
 - (b) $x \geq 0$ のとき, 不等式 $\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} \leq e^{-x} + x - 1$ が成り立つことを示せ。
- (4) 極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_2}{S_1}$ を求めよ。

1

問題のページへ

まず, $f(x) = 2x^3 + x^2 - 3$ より,

$$f'(x) = 6x^2 + 2x = 2x(3x+1)$$

よって, $y = f(x)$ のグラフの概形は右下

のようになる。

また, 点 $(t, 2t^3 + t^2 - 3)$ における接線

の方程式は,

$$y - (2t^3 + t^2 - 3) = (6t^2 + 2t)(x - t)$$




原点を通るとき,


$$-(2t^3 + t^2 - 3) = (6t^2 + 2t)(-t)$$

$$4t^3 + t^2 + 3 = 0, \quad (t+1)(4t^2 - 3t + 3) = 0$$

ここで, $4t^2 - 3t + 3 = 0$ は $D = 9 - 48 < 0$ より実数解をもたないので, $t = -1$ である。

このとき, 接線は $y = 4x$ であるので, 図より, 直線 $y = mx$ が曲線 $y = f(x)$ と相異なる 3 点で交わるような実数 m の範囲は, $m > 4$ である。

x	...	$-\frac{1}{3}$...	0	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		$-\frac{80}{27}$		-3	



[解説]

$f(x) = mx$ から, $x \neq 0$ のもとで定数 m を分離して, $\frac{f(x)}{x} = m$ として処理する方がクリアーです。しかし, 文系に同じ問題が出されており, そこでの誘導に沿った解法を記しています。

2

問題のページへ

$S(n) = \sum_{p=1}^{2n} \frac{(-1)^{p-1}}{p}$, $T(n) = \sum_{q=1}^n \frac{1}{n+q}$ に対して, $S(n) = T(n)$ を証明する。

(i) $n=1$ のとき

$$S(1) = \sum_{p=1}^2 \frac{(-1)^{p-1}}{p} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \quad T(1) = \sum_{q=1}^1 \frac{1}{1+q} = \frac{1}{2} \text{ より, } S(1) = T(1)$$

(ii) $n=k$ のとき

$S(k) = T(k)$, すなわち $\sum_{p=1}^{2k} \frac{(-1)^{p-1}}{p} = \sum_{q=1}^k \frac{1}{k+q}$ の成立を仮定する。

両辺に $\left(\frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+2}\right)$ を加えると,

$$\begin{aligned} \sum_{p=1}^{2(k+1)} \frac{(-1)^{p-1}}{p} &= \sum_{q=1}^k \frac{1}{k+q} + \left(\frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+2}\right) \\ &= \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \cdots + \frac{1}{2k} + \frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+2} \\ &= \frac{1}{k+2} + \cdots + \frac{1}{2k} + \frac{1}{2k+1} + \frac{1}{2k+2} = \sum_{q=1}^{k+1} \frac{1}{(k+1)+q} \end{aligned}$$

よって, $S(k+1) = T(k+1)$ となり, $n=k+1$ のときも成立する。

(i)(ii)より, 正の整数 n に対して, $S(n) = T(n)$ が成り立つ。

[解説]

たびたび出題されている有名問題です。神戸大でも出題されたとの記憶がありましたので, 調べたところ, 10年前の1995年でした。

3

問題のページへ

$\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{d}$ とおくと, 条件より,

$$|\vec{b}| = 1, \quad |\vec{c}| = 2, \quad |\vec{d}| = 3$$

$$\vec{b} \cdot \vec{c} = 1 \cdot 2 \cdot \cos 60^\circ = 1$$

$$\vec{c} \cdot \vec{d} = 2 \cdot 3 \cdot \cos 60^\circ = 3$$

$$\vec{d} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 1 \cdot \cos 90^\circ = 0$$

このとき, $\overrightarrow{AE} = x\vec{b} + y\vec{c} + z\vec{d}$ とおくと,

$$|\overrightarrow{BE}|^2 = |\overrightarrow{AE} - \vec{b}|^2 = |\overrightarrow{AE}|^2 - 2\overrightarrow{AE} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$$

$$= |\overrightarrow{AE}|^2 - 2(x+y) + 1$$

$$|\overrightarrow{CE}|^2 = |\overrightarrow{AE} - \vec{c}|^2 = |\overrightarrow{AE}|^2 - 2\overrightarrow{AE} \cdot \vec{c} + |\vec{c}|^2 = |\overrightarrow{AE}|^2 - 2(x+4y+3z) + 4$$

$$|\overrightarrow{DE}|^2 = |\overrightarrow{AE} - \vec{d}|^2 = |\overrightarrow{AE}|^2 - 2\overrightarrow{AE} \cdot \vec{d} + |\vec{d}|^2 = |\overrightarrow{AE}|^2 - 2(3y+9z) + 9$$

条件より, $|\overrightarrow{AE}| = |\overrightarrow{BE}| = |\overrightarrow{CE}| = |\overrightarrow{DE}|$ なので,

$$-2(x+y) + 1 = 0, \quad 2x + 2y = 1 \cdots \cdots \textcircled{1}$$


$$-2(x+4y+3z) + 4 = 0, \quad x + 4y + 3z = 2 \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$-2(3y+9z) + 9 = 0, \quad 2y + 6z = 3 \cdots \cdots \textcircled{3}$$

①②③より, $x = \frac{1}{2}$, $y = 0$, $z = \frac{1}{2}$ となり, $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{d} = \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{d})$

$$|\overrightarrow{AE}|^2 = \frac{1}{4}(|\vec{b}|^2 + 2\vec{b} \cdot \vec{d} + |\vec{d}|^2) = \frac{5}{2}$$

よって, $|\overrightarrow{AE}| = \sqrt{\frac{5}{2}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$



[解説]

$\angle DAB = 90^\circ$ なので, A を原点とする座標を設定して解こうか, どうしようかと迷いました。計算量はどちらでも同じぐらいでしょう。

4

問題のページへ

(1) 条件より, $x = t \cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}t \cdots \cdots \textcircled{1}$, $y = 1 - t^2 + t \sin \frac{\pi}{4} = 1 - t^2 + \frac{1}{\sqrt{2}}t \cdots \cdots \textcircled{2}$

$y = 0$ とすると, $\textcircled{2}$ から $1 - t^2 + \frac{1}{\sqrt{2}}t = 0$ より,

$$\sqrt{2}t^2 - t - \sqrt{2} = 0, (\sqrt{2}t + 1)(t - \sqrt{2}) = 0$$

$x \geq 0$ より $t \geq 0$ なので, $t = \sqrt{2}$ となり, $\textcircled{1}$ から点 Q の x 座標は $x = 1$ である。

(2) $x = t \cos \theta \cdots \cdots \textcircled{3}$, $y = 1 - t^2 + t \sin \theta \cdots \cdots \textcircled{4}$ に対して,

$t = 0$ のとき, $(x, y) = (0, 1)$

$t \neq 0$ のとき, $\textcircled{3}\textcircled{4}$ より $\cos \theta = \frac{x}{t}$, $\sin \theta = \frac{y-1+t^2}{t}$ から,

$$\left(\frac{x}{t}\right)^2 + \left(\frac{y-1+t^2}{t}\right)^2 = 1, x^2 + (y-1+t^2)^2 = t^2 \cdots \cdots \textcircled{5}$$

$\textcircled{5}$ は $(x, y) = (0, 1)$ を満たしているので, $t = 0$ のときも成り立つ。

さて, t が実数全体を動くとき, 曲線 $\textcircled{5}$ が通過する範囲は, $\textcircled{5}$ を t の方程式をしてみたとき, 実数 t が存在する条件として求めることができる。

$\textcircled{5}$ から, $x^2 + (y-1)^2 + 2(y-1)t^2 + t^4 = t^2$

$$t^4 + (2y-3)t^2 + x^2 + (y-1)^2 = 0 \cdots \cdots \textcircled{6}$$

ここで, $u = t^2 \geq 0$ とおくと, $\textcircled{6}$ は $u^2 + (2y-3)u + x^2 + (y-1)^2 = 0 \cdots \cdots \textcircled{7}$ となり, 2次方程式 $\textcircled{7}$ が, 0 以上の解を少なくとも 1 つもつ条件となる。

そこで, $f(u) = u^2 + (2y-3)u + x^2 + (y-1)^2$ とおき, $f(0) = x^2 + (y-1)^2 \geq 0$ に注意すると,


$$D = (2y-3)^2 - 4\{x^2 + (y-1)^2\} \geq 0 \cdots \cdots \textcircled{8}$$

$$u = -\frac{2y-3}{2} \geq 0 \cdots \cdots \textcircled{9}$$

$\textcircled{8}$ から, $-4y - 4x^2 + 5 \geq 0$, $y \leq -x^2 + \frac{5}{4}$

$\textcircled{9}$ から, $2y - 3 \leq 0$, $y \leq \frac{3}{2}$

以上まとめると, 曲線 C が通過する範囲は右図の網点部となる。ただし, 境界は領域に含まれる。



(3) 点 Q の x 座標の最大値は, (2) より $x = \frac{\sqrt{5}}{2}$ であり, $\textcircled{3}\textcircled{4}$ より,

$$\frac{\sqrt{5}}{2} = t \cos \theta \cdots \cdots \textcircled{10}, 0 = 1 - t^2 + t \sin \theta \cdots \cdots \textcircled{11}$$

$\textcircled{10}$ より, $t = \frac{\sqrt{5}}{2 \cos \theta}$ となり, $\textcircled{11}$ に代入すると,

$$1 - \frac{5}{4 \cos^2 \theta} + \frac{\sqrt{5} \sin \theta}{2 \cos \theta} = 0, 1 - \frac{5}{4}(1 + \tan^2 \theta) + \frac{\sqrt{5}}{2} \tan \theta = 0$$

まとめると,

$$5 \tan^2 \theta - 2\sqrt{5} \tan \theta + 1 = 0, (\sqrt{5} \tan \theta - 1)^2 = 0$$

よって, $\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$ である。

[解説]

難易度が高いというわけではありませんが、それなりに時間のかかる問題です。(2)では、まずパラメータ θ を動かし、その後、パラメータ t を動かして通過領域を求めました。

5

問題のページへ

(1) まず, $y = x^n \cdots \cdots \textcircled{1}$ に対して, $y' = nx^{n-1}$ また, $y = a \log x \cdots \cdots \textcircled{2}$ に対して, $y' = \frac{a}{x}$ \textcircled{1} と \textcircled{2} が点 $P(t, t^n)$ で共通接線をもつことより,

$$t^n = a \log t \cdots \cdots \textcircled{3}, \quad nt^{n-1} = \frac{a}{t} \cdots \cdots \textcircled{4},$$

\textcircled{4} より $nt^n = a$ なので, \textcircled{3} を代入して $na \log t = a$ から,

$$t = e^{\frac{1}{n}}, \quad a = ne$$

(2) 条件より, $S_1 = \int_0^t x^n dx = \left[\frac{1}{n+1} x^{n+1} \right]_0^t = \frac{t^{n+1}}{n+1}$

$$S_2 = \int_1^t a \log x dx = a \left[x \log x - x \right]_1^t = a(t \log t - t + 1)$$

$$(1) \text{より}, \quad \frac{S_2}{S_1} = \frac{a(n+1)(t \log t - t + 1)}{t^{n+1}} = \frac{n(n+1)e \left(e^{\frac{1}{n}} \cdot \frac{1}{n} - e^{\frac{1}{n}} + 1 \right)}{e^{\frac{n+1}{n}}}$$

$$= \frac{n(n+1) \left(e^{\frac{n+1}{n}} \cdot \frac{1}{n} - e^{\frac{n+1}{n}} + e \right)}{e^{\frac{n+1}{n}}} = n(n+1) \left(\frac{1}{n} - 1 + e^{-\frac{1}{n}} \right)$$

(3) (a) $f(x) = e^{-x} + x - 1 - \frac{x^2}{2}$ とおくと,


$$f'(x) = -e^{-x} + 1 - x, \quad f''(x) = e^{-x} - 1$$

 $x \geq 0$ のとき, $f''(x) \leq 0$ より, $f'(x) \leq f'(0) = 0$ よって, $f(x) \leq f(0) = 0$, すなわち $e^{-x} + x - 1 \leq \frac{x^2}{2}$ ($x \geq 0$) が成り立つ。(b) $g(x) = e^{-x} + x - 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} = f(x) + \frac{x^3}{6}$ とおくと,

$$g'(x) = f'(x) + \frac{x^2}{2} = -e^{-x} + 1 - x + \frac{x^2}{2} = -f(x)$$

 $x \geq 0$ のとき $g'(x) \geq 0$ より, $g(x) \geq g(0) = 0$ すなわち, $\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} \leq e^{-x} + x - 1$ ($x \geq 0$) が成り立つ。(4) (3) より, $x \geq 0$ のとき, $\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} \leq e^{-x} + x - 1 \leq \frac{x^2}{2}$ ここで, $x = \frac{1}{n} > 0$ とおくと,

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} \right)^2 - \frac{1}{6} \left(\frac{1}{n} \right)^3 \leq e^{-\frac{1}{n}} + \frac{1}{n} - 1 \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} \right)^2$$

各辺に $n(n+1)$ をかけて,

$$\frac{n+1}{2n} - \frac{n+1}{6n^2} \leq n(n+1) \left(\frac{1}{n} - 1 + e^{-\frac{1}{n}} \right) \leq \frac{n+1}{2n}$$

$$\text{よって, } \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right) - \frac{1}{6n} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \leq \frac{S_2}{S_1} \leq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right)$$

$n \rightarrow \infty$ のとき $\frac{S_2}{S_1} \rightarrow \frac{1}{2}$ から, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_2}{S_1} = \frac{1}{2}$ である。

[解説]

誘導が非常にていねいで, 今までにはなかったような形式です。特に, (3) の設問には驚いてしまいます。