

1

解答解説のページへ

xy 平面上に 2 定点 $A(1, 0)$ と $O(0, 0)$ をとる。また, m を 1 より大きい実数とする。

- (1) $AP : OP = m : 1$ を満たす点 $P(x, y)$ の軌跡を求めよ。
- (2) 点 A を通る直線で, (1) で求めた軌跡との共有点が 1 個のものを求めよ。また, その共有点の座標も求めよ。

2

解答解説のページへ

関数 $f(x) = b + \frac{1}{b} - e^{ax} - e^{-ax}$ について、以下の問いに答えよ。ただし、 $a > 0$, $b > 1$

とする。

- (1) $f(x) \geq 0$ を満たす x の範囲を求めよ。
- (2) 曲線 $y = \sqrt{f(x)}$ と x 軸で囲まれた図形を x 軸のまわりに 1 回転させてできる回転体の体積 V を求めよ。
- (3) $a = b \log b$ のとき、(2) で求めた体積 V を $V(b)$ と表す。このとき、 $\lim_{b \rightarrow \infty} V(b) = 2\pi$ となることを示せ。

3

解答解説のページへ

(1) $\int_0^{\pi} x^2 \cos^2 x dx$ を求めよ。

(2) 定数 a に対して、 $f(x) = ax \sin x + x + \frac{\pi}{2}$ とおく。このとき、不等式

$$\int_0^{\pi} \{f'(x)\}^2 dx \geq f\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

を満たす a の範囲を求めよ。ただし、 $f'(x)$ は $f(x)$ の導関数とする。

4

解答解説のページへ

- (1) 一般項 a_n が $an^3 + bn^2 + cn$ で表される数列 $\{a_n\}$ において、

$$n^2 = a_{n+1} - a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

が成り立つように、定数 a, b, c を定めよ。

- (2) (1)の結果を用いて、 $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$ となることを示せ。

- (3) $1, 2, \dots, n$ の相異なる 2 数の積のすべての和を $S(n)$ とする。たとえば、 $S(3) = 1 \times 2 + 1 \times 3 + 2 \times 3 = 11$ である。 $S(n)$ を n の 4 次式で表せ。

5

解答解説のページへ

$a \neq 0$ とする。 $A = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ に対して、2 次正方行列 P が

$$PA = A + B, \quad PB = A - B$$

を満たしている。

(1) a と b を用いて P を表し、 P が逆行列 P^{-1} をもつことを示せ。

(2) $\begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} = P^{-1}B$ とおく。 xy 平面において、点 (a, b) が放物線 $x = y^2 + 2$ 上を動くとき、点 (s, t) の軌跡を求めよ。ただし、 $|y| \leq 1$ とする。

6

解答解説のページへ

xy 平面上で、2 次曲線 $C : x^2 + ay^2 + by = 0$ が直線 $L : y = 2x - 1$ に点 P で接している。ただし、 $a \neq -\frac{1}{4}$ とする。

- (1) a と b の関係式を求めよ。
- (2) C が楕円、放物線、双曲線となるそれぞれの場合に、 b の値の範囲を求めよ。
- (3) C が楕円となる場合の接点 P の存在範囲を求め、 xy 平面上に図示せよ。

1

問題のページへ

(1) $AP : OP = m : 1$ より, $AP = mOP$ すなわち $AP^2 = m^2OP^2$ となり,

$$(x-1)^2 + y^2 = m^2(x^2 + y^2), \quad (m^2 - 1)x^2 + (m^2 - 1)y^2 + 2x - 1 = 0$$

$$m > 1 \text{ より, } x^2 + y^2 + \frac{2}{m^2 - 1}x - \frac{1}{m^2 - 1} = 0$$

$$\left(x + \frac{1}{m^2 - 1}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{m}{m^2 - 1}\right)^2 \dots\dots\dots(*)$$

よって, 点 P の軌跡は, 中心 $\left(-\frac{1}{m^2 - 1}, 0\right)$, 半径 $\frac{m}{m^2 - 1}$ の円である。

(2) A(1, 0) を通る直線 l を, $x = 1$ または $y = a(x - 1)$ (a は実数) とおく。

(i) $l : x = 1$ のとき

円(*)の中心と直線の距離は, $1 + \frac{1}{m^2 - 1} = \frac{m^2}{m^2 - 1}$ となるが, $m > 1$ より,

$$\frac{m^2}{m^2 - 1} > \frac{m}{m^2 - 1}$$

よって, 直線 $x = 1$ と円(*)の共有点はない。


(ii) $l : y = a(x - 1)$ のとき

条件から, 円(*)の中心と直線 $ax - y - a = 0$ の距離が, 半径に等しいことより,

$$\frac{\left|-\frac{a}{m^2 - 1} - a\right|}{\sqrt{a^2 + 1}} = \frac{m}{m^2 - 1}, \quad \frac{m|a|}{\sqrt{a^2 + 1}} = 1$$

よって, $m^2 a^2 = a^2 + 1$ から, $a = \pm \frac{1}{\sqrt{m^2 - 1}}$ となり,

$$l : y = \pm \frac{1}{\sqrt{m^2 - 1}}(x - 1)$$



さて, 直線 l の法線方向の単位ベクトル \vec{n} の成分は,

$$\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + 1}}(a, -1) = \frac{\sqrt{m^2 - 1}}{m} \left(\pm \frac{1}{\sqrt{m^2 - 1}}, -1\right) = \pm \left(\frac{1}{m}, \mp \frac{\sqrt{m^2 - 1}}{m}\right)$$

以上より, 接点の座標 (x, y) は, 右上図より,

$$(x, y) = \left(-\frac{1}{m^2 - 1}, 0\right) + \frac{m}{m^2 - 1} \left(\frac{1}{m}, \mp \frac{\sqrt{m^2 - 1}}{m}\right) = \left(0, \mp \frac{1}{\sqrt{m^2 - 1}}\right)$$

[解説]

接点の座標を求めるときに, 少し工夫をし, 単位ベクトルを利用して計算量を減らしています。

2

問題のページへ

(1) $f(x) = b + \frac{1}{b} - e^{ax} - e^{-ax}$ に対して、 $f(x) \geq 0$ とすると、

$$b + \frac{1}{b} \geq e^{ax} + \frac{1}{e^{ax}}, \quad e^{2ax} - \left(b + \frac{1}{b}\right)e^{ax} + 1 \leq 0$$

すると、 $(e^{ax} - b)\left(e^{ax} - \frac{1}{b}\right) \leq 0$ となり、 $b > 1$ から、

$$\frac{1}{b} \leq e^{ax} \leq b, \quad -\frac{1}{a} \log b \leq x \leq \frac{1}{a} \log b$$

(2) $f(-x) = b + \frac{1}{b} - e^{-ax} - e^{ax} = f(x)$ より、曲線 $y = \sqrt{f(x)}$ は y 軸対称である。

すると、この曲線と x 軸で囲まれた図形を x 軸のまわりに 1 回転させてできる回転体の体積 V は、

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^{\frac{1}{a} \log b} f(x) dx = 2\pi \left[\left(b + \frac{1}{b}\right)x - \frac{1}{a}e^{ax} + \frac{1}{a}e^{-ax} \right]_0^{\frac{1}{a} \log b} \\ &= 2\pi \left\{ \left(b + \frac{1}{b}\right) \frac{1}{a} \log b - \frac{1}{a}(e^{\log b} - 1) + \frac{1}{a}(e^{-\log b} - 1) \right\} \\ &= 2\pi \left\{ \frac{b^2 + 1}{b} \cdot \frac{\log b}{a} - \frac{1}{a}(b - 1) + \frac{1}{a}\left(\frac{1}{b} - 1\right) \right\} \\ &= \frac{2\pi}{ab} \left\{ (b^2 + 1) \log b - b^2 + 1 \right\} \end{aligned}$$

(3) $a = b \log b$ のとき、(2)より、

$$V(b) = \frac{2\pi}{b^2 \log b} \left\{ (b^2 + 1) \log b - b^2 + 1 \right\} = 2\pi \left(\frac{b^2 + 1}{b^2} - \frac{b^2 - 1}{b^2} \cdot \frac{1}{\log b} \right)$$

$$\text{よって、} \lim_{b \rightarrow \infty} V(b) = 2\pi \lim_{b \rightarrow \infty} \left\{ \left(1 + \frac{1}{b^2}\right) - \left(1 - \frac{1}{b^2}\right) \frac{1}{\log b} \right\} = 2\pi$$

[解説]

微積分の基本レベルの総合問題です。

3

問題のページへ

$$(1) \quad I = \int_0^{\pi} x^2 \cos^2 x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} x^2 (1 + \cos 2x) \, dx \text{ とおく。}$$

$$\text{ここで, } \int_0^{\pi} x^2 \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{\pi} = \frac{\pi^3}{3}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} x^2 \cos 2x \, dx &= \frac{1}{2} \left[x^2 \sin 2x \right]_0^{\pi} - \frac{1}{2} \int_0^{\pi} 2x \sin 2x \, dx = - \int_0^{\pi} x \sin 2x \, dx \\ &= \frac{1}{2} \left[x \cos 2x \right]_0^{\pi} - \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \cos 2x \, dx = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{4} \left[\sin 2x \right]_0^{\pi} = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$\text{よって, } I = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi^3}{3} + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi^3}{6} + \frac{\pi}{4}$$

$$(2) \quad J = \int_0^{\pi} \{ f'(x) \}^2 \, dx \text{ とおくと, } f(x) = ax \sin x + x + \frac{\pi}{2} \text{ より,}$$

$$\begin{aligned} J &= \int_0^{\pi} (a \sin x + ax \cos x + 1)^2 \, dx \\ &= \int_0^{\pi} (a^2 \sin^2 x + a^2 x^2 \cos^2 x + 1 + 2a^2 x \sin x \cos x + 2ax \cos x + 2a \sin x) \, dx \end{aligned}$$

$$\text{ここで, } \int_0^{\pi} (a^2 \sin^2 x + 2a^2 x \sin x \cos x) \, dx = a^2 \left[x \sin^2 x \right]_0^{\pi} = 0$$

$$\int_0^{\pi} (2ax \cos x + 2a \sin x) \, dx = 2a \left[x \sin x \right]_0^{\pi} = 0$$

$$\text{よって, (1)より, } J = \int_0^{\pi} (a^2 x^2 \cos^2 x + 1) \, dx = a^2 \left(\frac{\pi^3}{6} + \frac{\pi}{4} \right) + \pi$$

また, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}a + \pi$ から, $\int_0^{\pi} \{ f'(x) \}^2 \, dx \geq f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ を満たす a の範囲は,

$$a^2 \left(\frac{\pi^3}{6} + \frac{\pi}{4} \right) + \pi \geq \frac{\pi}{2}a + \pi, \quad a \{ (2\pi^2 + 3)a - 6 \} \geq 0$$

$$\text{以上より, } a \leq 0, \quad \frac{6}{2\pi^2 + 3} \leq a$$

[解説]

定積分の計算問題です。(2)は, そのまま計算してもよいのですが, 何か裏があるとみるのが常識的です。

4

問題のページへ

$$(1) \quad a_n = an^3 + bn^2 + cn \text{ に対して, } n^2 = a_{n+1} - a_n \text{ より,}$$

$$n^2 = a\{(n+1)^3 - n^3\} + b\{(n+1)^2 - n^2\} + c\{(n+1) - n\}$$

$$3an^2 + (3a + 2b)n + (a + b + c) = n^2$$

どんな n に対しても成立する条件は,

$$3a = 1, \quad 3a + 2b = 0, \quad a + b + c = 0$$

$$\text{よって, } a = \frac{1}{3}, \quad b = -\frac{1}{2}, \quad c = \frac{1}{6}$$

$$(2) \quad (1) \text{ より, } \sum_{k=1}^n k^2 = \sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_1 \text{ となり, } a_1 = a + b + c = 0 \text{ から,}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k^2 &= \frac{1}{3}(n+1)^3 - \frac{1}{2}(n+1)^2 + \frac{1}{6}(n+1) \\ &= \frac{1}{6}(n+1)\{2(n+1)^2 - 3(n+1) + 1\} = \frac{1}{6}(n+1)(2n^2 + n) \\ &= \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \end{aligned}$$

(3) $1, 2, \dots, n$ の相異なる 2 数の積のすべての和 $S(n)$ は,

$$\begin{aligned} S(n) &= \frac{1}{2}\{(1+2+3+\dots+n)^2 - (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2)\} \\ &= \frac{1}{2}\left\{\frac{1}{4}n^2(n+1)^2 - \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)\right\} \\ &= \frac{1}{24}n(n+1)\{3n(n+1) - 2(2n+1)\} = \frac{1}{24}n(n+1)(3n^2 - n - 2) \\ &= \frac{1}{24}n(n+1)(n-1)(3n+2) \end{aligned}$$

[解説]

数列の和の公式を証明する基本問題です。また, (3)は有名問題です。

5

問題のページへ

(1) 条件より, $P \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 1+b \end{pmatrix}$, $P \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a \\ 1-b \end{pmatrix}$ となり,

$$P \begin{pmatrix} 0 & a \\ 1 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -a \\ 1+b & 1-b \end{pmatrix}$$

$a \neq 0$ より, $\begin{pmatrix} 0 & a \\ 1 & b \end{pmatrix}^{-1}$ は存在するので,

$$\begin{aligned} P &= \begin{pmatrix} a & -a \\ 1+b & 1-b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & a \\ 1 & b \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{-a} \begin{pmatrix} a & -a \\ 1+b & 1-b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b & -a \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{a} \begin{pmatrix} -ab-a & a^2 \\ -b^2-2b+1 & a+ab \end{pmatrix} \end{aligned}$$

すると, $\det P = \frac{1}{a^2} \{ -(ab+a)^2 - a^2(-b^2-2b+1) \} = -2$ より, P^{-1} は存在する。

(2) $PA = A+B$, $PB = A-B$ より,

$$A = P^{-1}A + P^{-1}B \cdots \cdots \textcircled{1}, \quad B = P^{-1}A - P^{-1}B \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}\textcircled{2}$ より, $2P^{-1}B = A - B$

ここで, 条件より, $\begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} = P^{-1}B$ なので, $2 \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a \\ 1-b \end{pmatrix}$ となり,

$$a = -2s \cdots \cdots \textcircled{3}, \quad b = 1 - 2t \cdots \cdots \textcircled{4}$$

さて, 点 (a, b) が放物線 $x = y^2 + 2$ ($|y| \leq 1$) 上を動くことより,

$$a = b^2 + 2 \quad (|b| \leq 1)$$

$\textcircled{3}\textcircled{4}$ を代入すると, $-2s = (1-2t)^2 + 2$ ($|1-2t| \leq 1$) となり,

$$\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 = -\frac{1}{2}(s+1) \quad (0 \leq t \leq 1)$$

よって, 点 (s, t) の軌跡は, 放物線 $\left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = -\frac{1}{2}(x+1)$ ($0 \leq y \leq 1$) である。

[解説]

$\textcircled{3}\textcircled{4}$ 式を導く部分は工夫をしていますが, 行列 P の成分で計算をしても, 少々時間がかかるだけです。

6

問題のページへ

- (1) $C : x^2 + ay^2 + by = 0 \cdots \cdots \textcircled{1}$, $L : y = 2x - 1 \cdots \cdots \textcircled{2}$ が接することより,
 $x^2 + a(2x - 1)^2 + b(2x - 1) = 0$, $(4a + 1)x^2 - 2(2a - b)x + a - b = 0 \cdots \cdots \textcircled{3}$
 $4a + 1 \neq 0$ から, $D/4 = (2a - b)^2 - (4a + 1)(a - b) = 0$ となり,

$$b^2 + b - a = 0$$

- (2) (1)から, $a = b^2 + b \neq -\frac{1}{4}$ より, $(b + \frac{1}{2})^2 \neq 0$ すなわち $b \neq -\frac{1}{2}$ のもとで,

$$C : x^2 + (b^2 + b)y^2 + by = 0 \cdots \cdots \textcircled{4}$$

- (i) $b^2 + b = 0$ ($b = 0, -1$)のとき

$b = 0$ のとき④は $x = 0$, $b = -1$ のとき④は $y = x^2$ となる。

- (ii) $b^2 + b \neq 0$ ($b \neq 0, b \neq -1$)のとき

$$\textcircled{4} \text{より, } x^2 + (b^2 + b)\left(y^2 + \frac{1}{b+1}y\right) = 0$$

$$x^2 + (b^2 + b)\left(y + \frac{1}{2b+2}\right)^2 = \frac{b}{4b+4}$$

よって, $b^2 + b > 0$ ($b < -1, 0 < b$)のとき $\frac{b}{4b+4} > 0$ となり楕円を表し, また,
 $b^2 + b < 0$ ($-1 < b < 0$)のとき双曲線を表す。

以上より, 2次曲線 C は $b < -1, 0 < b$ のとき楕円, $-1 < b < -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} < b < 0$ のとき双曲線, $b = -1$ のとき放物線となる。

- (3) 接点 P の x 座標は, ③より,

$$\begin{aligned} x &= \frac{2a - b}{4a + 1} = \frac{2(b^2 + b) - b}{4(b^2 + b) + 1} = \frac{b(2b + 1)}{(2b + 1)^2} \\ &= \frac{b}{2b + 1} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2(2b + 1)} \end{aligned}$$



C は $b < -1, 0 < b$ のとき楕円となるので,

$$0 < x < \frac{1}{2}, \frac{1}{2} < x < 1$$

よって, 接点 P の存在範囲は,

$$y = 2x - 1 \left(0 < x < \frac{1}{2}, \frac{1}{2} < x < 1 \right)$$

これを図示すると, 右図の太線部となる。ただし, 白丸は含まない。



[解説]

計算量はやや多めですが, 2次曲線の標準的な問題です。